RATIMUR PASTA CEBO

CEBO FRESCO RODENTICIDA

Composición:	- Bromadiolona - Sustancia de sabor amargo - Excipiente csp	0,004% 0,002% 100%
Formulación:	Granulado	
Envases:	15, 100, 250 cl, 1,5 y 20 l	
Nº Registro:	19.618	
Clasificación Toxicológica:	Xn (A,A,C) Muy peligroso para peces y abejas.	

RATIMUR PASTA CEBO FRESCO es un cebo rodenticida a base de Bromadiolona, especialmente formulado con el óptimo contenido y textura de cebo alimentario. El producto se mantiene fresco tanto en áreas húmedas como secas.

Aplicaciones autorizadas:

Rodenticida de alta eficacia contra ratas y ratones para uso en la indústria alimentaria. Exclusivamente por personal especializado.

Dosis y modo de empleo :

Según el grado de infestación aplicar a las siguientes dosis:
- Ratones: 25g.
- Ratas: 100g.

Localizar los portacebos correctamente etiquetados en las proximidades de las madrigueras y zonas de tránsito de los roedores.
Antes de colocar el producto es necesario inspeccionar detenidamente la zona de infestación para localizar las sendas y las madrigueras. Una vez determinados los lugares donde se situará el cebo, éste se colocará protegido, para evitar que lo ingieran otros animales y facilitar que lo ingiera el roedor.

Se tomarán todas las medidas necesarias para evitar que el producto contamine los utensilios, los alimentos y sus envases, así como las superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos.

Recomendaciones:

-No tocar el cebo con las manos para evitar que los roedores desconfíen (utilizar guantes en la manipulación del producto).
-Reponer los cebos consumidos o deteriorados diariamente, durante al menos 10-15 días consecutivos. Los portacebos deben mantenerse llenos de cebo, hasta que haya desaparecido la actividad de los roedores, que se observa porque el cebo permanece intacto.
-Controlados los roedores, es conveniente mantener una serie de emplazamientos para prevenir una reinvasión.

Primeros auxilios:

-Retire a la persona de la zona contaminada.
-Quite la ropa manchada o salpicada.
-Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
-Lave la piel con abundante agua y jabón. Sin frotar.
-En caso de ingestión, NO provoque el vómito.
-Mantenga al paciente en reposo.
-Conserve la temperatura corporal.
-Controle la respiración. Si fuera necesario respiración artificial.
-Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
-Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos:

. Si no han transcurrido dos horas desde la ingesta, realizar vaciado gástrico, administrando a continuación una dosis de carbón activado (25g).
. Antídoto: vitamina K1 (Konakion®)
. Controle el tiempo de protrombina.o INR
. Tratamiento sintomático.

Gestión de envases:

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del Sistema integrado de gestión SIGFITO.